


Chấy đầu

Giống chấy vẫn sống đến ngày hôm nay khắp nơi trên thế giới. Chấy thì không nguy hiểm tới sức khoẻ con người. Ai cũng có thể bị, không vì bản thân. Chấy lây qua sự sờ mó và thường xuyên theo dịch, đặc biệt nơi trẻ em tụ tập ví dụ như ở các trường mẫu giáo và phổ thông.

Chấy dài khoảng từ 2 tới 3 mm nhưng có lúc không dễ nhìn thấy và chấy con thì khó mà nhìn thấy bằng mắt. Không có thể diệt chúng bằng cách gội đầu với dầu gội thường và không thể ngâm nước để giết chúng. Chấy sinh trưởng trong vòng 10 ngày và rời sinh trứng. Trứng chấy rất nhỏ bám chặt vào chân tóc gần da đầu. Trứng chấy nở ra trong vòng từ 6 đến 10 ngày.



Cách trị liệu khá hiệu quả:

- Trước hết muốn tìm chấy phải dùng lược dày để chải. Cần thiết phải chải trong chỗ sáng có đèn rọi để dễ thấy chấy nếu chúng bị tuột ra khỏi tóc.
- Cần phải bôi lên tóc một loại thuốc dùng riêng cho chấy có thể mua ở tiệm thuốc tây mà không cần giấy bác sĩ. Nên nhớ chỉ dùng cho những ai bị chấy. Tuyệt đối không dùng cho tất cả mọi người trong gia đình hoặc trong lớp học vì có thể gây ra dị ứng do chấy gặp phải loại thuốc này. Điều quan trọng là làm theo lời chỉ dẫn của bản giải thích kèm theo và tốt nhất hỏi ý kiến các nhân viên trong tiệm thuốc tây hay trạm y tế địa phương. Phụ nữ đang có thai hay các con em dưới hai tuổi không được dùng loại thuốc bôi này ngoại trừ có sự đồng ý của bác sĩ.
- Sau khi trị liệu cần phải chải tóc thường xuyên đều đặn để biết chắc là không còn chấy nữa. Thông thường nên làm lại sau một đến hai tuần vì trứng chấy có thể còn sót lại. Có thể diệt trứng chấy bằng cách bôi lên tóc một loại hỗn hợp nửa phần nước và nửa phần dấm. Rồi dùng lược dày để chải tóc.
- Cần phải tẩy giặt quần áo và chăn gối ra giường của ai bị chấy. Trong vòng 30 phút ở độ nóng 50 độ, cũng như ở độ lạnh 50 độ âm chấy sẽ chết, nhưng trứng chấy phải mất một tiếng đồng hồ mới chết với độ nóng 50 độ và phải mất bốn tiếng đồng hồ ở độ lạnh 50 độ âm. Có thể dùng máy hút để hút với những đồ không thể giặt được. Chấy có thể sống trên 50 tiếng đồng hồ mà không cần phải hút máu.

Quan trọng nhất là phải thận trọng lúc trị liệu vì khi coi thường cách trị liệu sẽ làm chấy dễ phát sinh và lan truyền ra. Cần thiết phải báo cho nhà trường hay nơi giữ trẻ nếu con em bị chấy.

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang mạng : www.landlaeknir.is